



គ្រិនផ្កាសាយធំគឺជាវីរុស មិនមែនជាផ្កាសាយធម្មតាទេ។ ផ្កាសាយធំអាចបង្កឱ្យមាន ជំងឺហើមស្លុត ការចូលសម្រាកពេទ្យ និងអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់។ អ្នកឆ្លងផ្កាសាយធំពី អ្នកដទៃដែលក្អក ឬកណ្តាស់។ អ្នកអាចឆ្លងផ្កាសាយធំដោយសារប៉ះផ្ទៃវត្ថុដែល បុគ្គលមានជំងឺបានប៉ះ។ យើងគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងរដូវផ្កាសាយធំ ដែលជា អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាន។

**សូមអនុវត្តវិធានការខាងក្រោមដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក និងអ្នកដទៃពីផ្កាសាយធំ៖**



- ការចាក់ថ្នាំបង្ការផ្កាសាយធំនៅពេលនេះ គឺជាវិធីប្រសើររបស់យើងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺនេះ។
  - ការចាក់ថ្នាំបង្ការផ្កាសាយធំ គឺសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលមានអាយុចាប់ពីប្រាំមួយខែឡើងទៅ។
  - ការចាក់ថ្នាំបង្ការផ្កាសាយធំមានសារៈសំខាន់ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ ដោយសារវាជួយការពារខ្លួនអ្នក និងកូនរបស់អ្នក។
  - ទីតាំងគ្លីនិកផ្កាសាយធំដែលនៅជិតអ្នក៖ \*សូមបញ្ចូលតំណភ្ជាប់\*
- សូមលាងដៃរបស់អ្នករយៈពេល 20 វិនាទី ជាមួយសាប៊ូ និងទឹកស្អាត។ ប្រសិនបើពុំមានទឹក និងសាប៊ូទេ សូមប្រើប្រាស់ទឹកលាងដៃសម្លាប់មេរោគ។
- សូមជៀសវាងកុំប៉ះពាល់ភ្នែក ច្រមុះ និងមាត់។ មេរោគត្រូវបានចម្លងតាមការប៉ះពាល់បែបនេះ។
- សូមព្យាយាមនៅឱ្យឆ្ងាយពីក្រុមមនុស្សកកកុញ។ សូមព្យាយាមនៅឆ្ងាយពីសមាជិកគ្រួសារដែលឈឺ។
- សូមខ្ទប់ច្រមុះ និងមាត់ដោយប្រើក្រដាសជូតមាត់ នៅពេលអ្នកក្អក ឬកណ្តាស់។ សូមបោះចោលក្រដាសជូតមាត់ ក្នុងធុងសំរាមបន្ទាប់ពីប្រើរួច។ សូមកុំភ្លេចលាងដៃរបស់អ្នកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីញីសំបោរ ក្អក ឬកណ្តាស់រួច។ ប្រសិនបើអ្នកពុំមានក្រដាសជូតមាត់ទេ សូមប្រើកែងដៃខ្ទប់នៅពេលក្អក ឬកណ្តាស់។
- ត្រូវសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃវត្ថុនានានៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដែលអាចមានជាប់មេរោគ។

**ប្រសិនបើអ្នកមានផ្កាសាយធំ៖**

- សូមសម្រាកនៅផ្ទះ។
- សម្រាកនៅផ្ទះឆ្ងាយពីអ្នកដទៃយ៉ាងតិច 7 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមឈឺ ឬយ៉ាងតិច 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមជំងឺគ្រិនផ្កាសាយធំមានការវិវត្ត ដែលត្រូវយកជម្រើសមួយណាដែលមានរយៈពេលវែងជាង។



**Contact**  
Public Health Department:  
(510) 267-8000 Main Line  
COVID-19 Information:  
(510) 268-2101  
[www.acphd.org](http://www.acphd.org)

Colleen Chawla – Agency Director  
Kimi Watkins-Tartt – Director  
Nicholas Moss, MD – Interim Health Officer